

가족보건, 산업보건 모두를 지킬 수 있는 **성인 예방접종**



대상 포진

대상 : 만 50세 이상 1회 접종
전파 : 수포의 직접접촉
증상 : 발진과 수포가 신경절 분포로 편측에 국한적 발생하며 해당부위에 통증과 지각 이상 증상

자궁 경부암

대상 : 만 15~26세 0, 2, 6개월 간격 3회접종
전파 : 감염자와의 성관계
증상 : 감염 증상이 없고 자연소멸 되지만, 지속적 감염은 자궁경부 전암병변, 자궁경부암, 항문 및 생식기 사마귀와 호흡기에 생기는 유두종 등 다양한 질환을 일으킴

폐렴

대상 : 만 19세 이상 성인 면역력 저하상태 만 65세 이상 노인
전파 : 상기도에 있는 폐렴구균은 주로 호흡기 비말을 통해 전파
증상 : 비침습성(부비동염, 중이염, 폐렴) 감염과 침습성감염(수막염 등) 구분하며 성인에게는 폐렴이 가장 흔함

수막 구균

대상 : 신임 훈련병, 수막구균 유행지역 여행자 또는 체류자, 기숙사 등 집단 생활 거주자
전파 : 환자나 보균자의 비강인두에 접촉하고 있다가 비말이나 분비물을 통해 전파
증상 : 두통, 발열, 오심 등이 나타나며, 더 진행되면 의식이 혼탁해짐

파상풍

대상: 만 11세(Tdap 권장) 이후 10년 주기접종 Tdap / Td 으로 접종 권장
전파: 상처를 통해 인체에 유입되면 혐기상태 독소 생성되며 혈류와 림프관을 통해 신경 조직에 작용
증상: 잠복기 3~21일, 임상증상에 따라 국소, 두부, 전신형으로 저작근 수축, 경부 경직, 연하 곤란, 복부근육 수축 등

풍진

대상: 임신 전 가임기 여성
전파: 호흡기를 통한 풍진바이러스 감염
증상: 노출 후 5~7일째 전신으로 퍼짐. 두부의 림프절 종창, 미열, 권태감 등을 보임. 태아의 경태반 감염은 태아 세포를 파괴시키고 세포분열을 정지시킴으로써 임신 초기 태아 사망, 자궁내 발육부전, 백내장, 난청, 선천성 심장질환 등

A형 간염

대상: A형간염 접종 경험이 없는 고위험군. 발생률이 높은 국가여행, 만성 간질환자, A형간염 환자 접촉자 등
전파: 사람에서 사람으로 직접적으로 전파되거나 변에 오염된 물이나 음식을 섭취
증상: 고열, 권태감, 식욕부진, 오심, 복통, 진한 소변, 황달 등

B형 간염

대상: B형간염 바이러스 보유자 가족, 혈액투석환자, 의료기관종사자, 수용시설 수용자, 근무자 등
전파: 감염된 사람의 혈액이나 체액을 통해 전파. B형간염 산모로부터 신생아, 성적접촉, 비위생적 시술기구(문신, 귀걸이, 피어싱)
증상: 침묵의 질환으로 자각증상이 없음. 피로, 발열, 근육통, 관절통, 식욕상실, 구토, 황달

일본 뇌염

대상: 위험지역(논, 돼지축사인근) 거주자, 유행, 국가 이주 및 여행자, 거주할 외국인 등
전파: 작은빨간집모기에 물리면 감염
증상: 열을 동반하는 가벼운 증상이나 수막염으로 이행되기도 하고 드물게 뇌염으로 진행됨

독감 백신

대상: 인플루엔자 바이러스 감염 고위험군, 전파시킬 위험에 있는 대상자 등
전파: 기침이나 재채기 할 때 호흡기 비말을 통해
증상: 갑작스런 발열, 두통, 근육통, 피로감 등 전신 증상